

# Programa PDT-sm

**Xarxa Catalana**  
d'Hospitals sense fum

Dades 2016



Presentació del programa

maig 2013

*realització del protocol d'intervenció als hospitals*

Inici del programa als hospitals

setembre 2013 – febrer 2014

Primera reunió de seguiment

juny 2014

Segona reunió de seguiment

juliol 2015

11 hospitals

+ 1 nova

incorporació

# Questionari de seguiment


---

# Circuits d'intervenció


## Nous circuits

## Circuits efectius

Nº d'hospitals



Nº d'hospitals




D'acord / Molt d'acord

# Augment de la intervenció


## Hospitalària

## Ambulatòria

Nº d'hospitals



Nº d'hospitals




D'acord / Molt d'acord

# Coordinació hospital-ambulatori


És efectiva

Ha millorat

Nº d'hospitals



Nº d'hospitals




D'acord / Molt d'acord

# Implementació del programa


El personal l'ha facilitat

Els caps l'han facilitat

Nº d'hospitals



Nº d'hospitals




D'acord / Molt d'acord

# Augment del personal implicat


## Hospitalari

## Ambulatori

Nº d'hospitals



Nº d'hospitals



D'acord / Molt d'acord



# El programa PDT-sm

---

La provisió de fàrmacs és un factor clau (+82%)

---

Registre de dades carregós (+54%)

---

Coordinació de la Xarxa (+100%, amb marge de millora)

---

Millora l'atenció integral del pacient (+100%)

---

Balanç cost-benefici (+91%)

---

Valoració general del programa (+100%)

---

# Resultats del programa

---

# Mostra

N=197

Edat (anys): 46,6 (DT 10,0)

Sexe: 63,7% homes

Cigarretes/dia: 26,9 (DT 12,2)

Edat d'inici: 16,1 (DT 4,9)

Intents previs: 1,0 (DT 1,4)

49,5% cap intent

44,8% entre 1 i 3 intents

5,7% més de 3 intents

Fagerström: 6,8 (DT 2,2)

Richmond: 8,2 (DT 1,5)


## Carboximetria

Inici: 18,5 (DT 14,4)


Alta: 1,9 (DT 2,7)

Primera visita: 5,7 (DT 6,8)


## Tipus de dispositiu




## Dispositiu de derivació



## Diagnòstic principal



## Consum d'altres tòxics (% de cada tòxic sobre el total de la mostra, n=197)



## Patologia orgànica

(% de cada patologia sobre el total de la mostra, n=197)

Respiratòria: 43 (21,8%)

Cardiovascular: 25 (12,6%)

Digestiva: 24 (12,1%)

Oncològica: 4 (2,0%)

SNC: 3 (1,5%)

Altres: 43 (21,8%)

## Durant l'ingrés

91,7%: pegats de TSN durant l'ingrés

80,1%: TSN oral durant l'ingrés

80,6% intervenció psicològica o psicoeducativa durant l'ingrés

# % d'abstinència

N=197

1a visita

65,5% abstinentes (129 de 197)

1r mes

41,4% abstinentes (77 de 186)

3r mes

24,3% abstinentes (42 de 173)

6è mes

15,1% abstinentes (24 de 159)

12è mes

7,3% abstinentes (8 de 109)

# Programa PDT-sm

**Xarxa Catalana**  
d'Hospitals sense fum

Dades 2015



Generalitat de Catalunya  
**Agència de Salut Pública**  
de Catalunya



**ICO**  
Institut Català d'Oncologia